

内視鏡検査後の注意事項

検査終了後の注意事項です。下記の★印と✕のついた項目を守って下さい。

- ★ 検査終了直後は、緊張や、胃の動きを押さえる注射の影響で動悸、フラツキを感じることがあります。そのような方は、30分位ベッドで横になっていた方が良いので申し出て下さい。
- ★ のどの麻酔が切れるまでには、約1～2時間かかります。その間は下を向いて軽く口をすすぐ程度にして下さい。1～2時間位経って、のどがいつものような感じになったら少量の水を飲み、むせずにうまく飲込める事を確かめてから飲食をはじめして下さい。もし、むせてしまうときはもう30分ほど待ってから再度試して下さい。
- ★ 検査後、大量の血を吐いたり、黒いタール様の便が出るときは、すぐに病院へ連絡して下さい。
- 鎮静剤を注射(点滴)した方は、眠気やフラツキ感が残りますので、しばらく病院のベッドで休んで下さい。その日は車の運転等危険を伴う作業を控えてください。
- 検査中に色素散布をした方は、検査後青い尿が出たり、便が青みがかかる事がありますが、すぐ普通の色に戻りますから心配はいりません。
- 生検(病理検査)の標本を採取した方は、胃粘膜から少量の出血がありますので、検査当日は刺激物(香辛料、柑橘類等)や酒類の摂取は控えて下さい。翌日の便が、少し黒っぽくなることがあります。その後も、黒いタール様の便が続くようでしたら、すぐにご連絡ください。
- およそ10日で生検の結果が出ますので必ず聞きに来て下さい。
- 血が止まりにくくなるお薬を中断していた方は、_____日から服薬を再開して下さい。

日本内科学会認定内科医、医学博士: 奈須 一

奈 須 内 科

055-263-6677

同じ内容は、奈須内科のホームページでも見ることができます。Visit our website//www.DrNasu.com