

前回の検査で高脂血症（血液中の脂肪が多い状態）が認められました。特に中性脂肪の値は、検査前日のアルコール量や食事内容の影響を受けやすい検査です。次回は、正確な値を調べたいので、**検査前10時間の絶食後に採血を行いたい**と思います。従って、**検査前日の夕飯後は、果物やお菓子、ジュース、缶コーヒー、酒類（アルコール類）の摂取をしないで、翌朝、朝食抜き**で来院し、採血をうけて下さい。

奈須内科 Tel 63-6677

奈須内科患者指導箋

日本内科学会認定内科医，日本リウマチ学会認定医，日本消化器内視鏡学会認定医：奈須 一

前回の検査で高脂血症（血液中の脂肪が多い状態）が認められました。特に中性脂肪の値は、検査前日のアルコール量や食事内容の影響を受けやすい検査です。次回は、正確な値を調べたいので、**検査前10時間の絶食後に採血を行いたい**と思います。従って、**検査前日の夕飯後は、果物やお菓子、ジュース、缶コーヒー、酒類（アルコール類）の摂取をしないで、翌朝、朝食抜き**で来院し、採血をうけて下さい。

奈須内科 Tel 63-6677

奈須内科患者指導箋

日本内科学会認定内科医，日本リウマチ学会認定医，日本消化器内視鏡学会認定医：奈須 一

前回の検査で高脂血症（血液中の脂肪が多い状態）が認められました。特に中性脂肪の値は、検査前日のアルコール量や食事内容の影響を受けやすい検査です。次回は、正確な値を調べたいので、**検査前10時間の絶食後に採血を行いたい**と思います。従って、**検査前日の夕飯後は、果物やお菓子、ジュース、缶コーヒー、酒類（アルコール類）の摂取をしないで、翌朝、朝食抜き**で来院し、採血をうけて下さい。

奈須内科 Tel 63-6677

奈須内科患者指導箋

日本内科学会認定内科医，日本リウマチ学会認定医，日本消化器内視鏡学会認定医：奈須 一

前回の検査で高脂血症（血液中の脂肪が多い状態）が認められました。特に中性脂肪の値は、検査前日のアルコール量や食事内容の影響を受けやすい検査です。次回は、正確な値を調べたいので、**検査前10時間の絶食後に採血を行いたい**と思います。従って、**検査前日の夕飯後は、果物やお菓子、ジュース、缶コーヒー、酒類（アルコール類）の摂取をしないで、翌朝、朝食抜き**で来院し、採血をうけて下さい。

奈須内科 Tel 63-6677

奈須内科患者指導箋

日本内科学会認定内科医，日本リウマチ学会認定医，日本消化器内視鏡学会認定医：奈須 一